

**蠶豆症病患應避免使用之藥物及食物**

Medicines and other substances likely to be **UNSAFE** in moderate to severe G6PD deficiency

Medications	本院現有之品項	建議
Chlorpropamide	無	不建議使用
Dabrafenib	無	不建議使用
Dapsone (diaminodiphenyl sulfone)	無	不建議使用
Methylene blue	無	不建議使用
Nitrofurantoin, nitfuratel and nitrofurazone	無	不建議使用
Phenazopyridine	無	不建議使用
Primaquine	無	不建議使用
Rasburicase and pegloticase	無	不建議使用

**Chemical exposures and foods**

	建議
Fava beans(蠶豆)	避免食用
Henna compounds (black and red Egyptian)(指甲花)	避免接觸
Naphthalene (mothballs, lavatory deodorant)(萘)	避免接觸
Phenylhydrazine	避免接觸
"RUSH" (isobutyl nitrate, amyl nitrate)	避免接觸

Medicines that are **PROBABLY SAFE** given in usual therapeutic doses in G6PD deficiency

Medications	本院現有之品項	建議
Acetaminophen (Tylenol, Paracetamol)	Depyretin Tab(Acetaminophen)500mg、Soma Cap(Acetaminophen 250mg+Chlorzoxazone 150mg+Caffeine Anhydrous 20mg+Thiamine 7.7mg)、Acetaminophen Sol'n 1440mg/60ml/bot(Anti-phen)、*Utraphen tab(Tramadol 37.5mg/Acetaminophen 325mg)、Propacetamol 1gm/vial (Acetamol)	在安全的治療範圍內可以使用
NSAIDs	Aspirin 100mg/cap(Bokey)、Acemet 60mg/cap(Acemetacin)、Ascofen 100mg/tab(Aceclofenac)、Naproxen 500mg/tab(Seladin)、Ibuprofen 400mg/tab(Purfen)、Ibuprofen susp. 1.2gm/60ml/bot(Idofen)、KetoPROFEN 50mg/2ml/amp(Ketoprofen)、Flur Di Fen Patch(酸痛貼布)、Diclofenac 12.5mg Supp(Voren)、25mg Diclofenac Supp(Voren)、Diclofenac 75mg/3ml/amp(Voren)、Diclofenac 25mg/tab(Volna-k)、100mg Diclofenac tab(Votan)、Meloxicam 15mg/tab(Meloxin)、Mefenamic acid 250mg/cap (Potarlon)、Celecoxib 200mg/cap(Selexib)、Etoricoxib 60mg/tab(Arcoxia)、Etoxib)、Etofenamate gel 100mg/g(Tonin)	建議依臨床評估，先使用其他成分藥品，如Acetaminophen
Antazoline (antihistamine)	Alminto Eye Drops (Antazoline/Tetrahydrozoline/Chlorhexidine)	在安全的治療範圍內可以使用
Antipyrine (phenazone)	無	
Ascorbic acid (vitamin C)	Ascorbic acid 100mg/2ml/amp(Vitacicol)	在安全的治療範圍內可以使用
Aspirin (acetylsalicylic acid)	Aspirin 100mg/cap(Bokey)	建議依臨床評估，先使用其他成分藥品，如Acetaminophen
Benzhexol (Artane)	無	
Chloromphenacol	無	
Colchicine	Colchicine 0.5mg/tab	在安全的治療範圍內可以使用
Cotrimazole	無	
Diphenhydramine (Benedryl)	Vena-calcium B6 5ml/amp(Diphenhydramine 20mg/Pyridoxine 5mg)、(Vena)DiphenhydrAMINE 10mg/tab、	在安全的治療範圍內可以使用
Glyburide	無	
Isoniazide	Isonicotinic 100mg (Isoniazide)	
Levodopa (L-Dopa) and levodopa-carbidopa	Bendopar 125mg/cap(Levodopa 100mg/Benserazide 25mg)、Madopar HBS 125mg/cap(Levodopa 100mg/Benserazide 25mg)、	在安全的治療範圍內可以使用
Naladixic acid	無	
Para-aminosalicylic acid	無	

Para-aminobenzoic acid (PABA)	無	
Phenylbutazone	無	
Phenytoin	Phenytoin 250mg/5ml/amp (Aleviatin) 、 Phenytoin 100mg/cap(Dilantin)	在安全的治療範圍內 可以使用
Probenecid (Benemid)	無	
Procainamide (Pronestyl)	無	
Pyrimethamine (Daraprim)	無	
Quinine	無	
Streptomycin	無	
Sulfa-containing drugs (sulfacetamide, sulfadiazine, sulfamethoxazole [Gantanol], trimethoprim-sulfamethoxazole, sulfamethoxyipyridazine [Kynex], sulfanilamide, sulfisoxazole [Gantrisin])	Sulfadiazine 10mg/gm 20gm/tub(Silverzine) 、 15ml/bot Kingmin (Sulfamethoxazole) 、 Kingmin 5ml/bot(Sulfamethoxazole) 、 Sulfacotrim susp. 60ml/bot(Trimethoprim 8mg/ml+Sulfamethoxazole 40mg/ml) 、 Baktar tab(Sulfamethoxazole 400mg/Trimethoprim 80mg)	不建議使用
Tiaprofenic acid	無	
Trimethoprim	Sulfacotrim susp. 60ml/bot(Trimethoprim 8mg/ml+Sulfamethoxazole 40mg/ml) 、 Baktar tab(Sulfamethoxazole 400mg/Trimethoprim 80mg)	不建議使用
Tripelennamine (Pyribenzamine)	無	
Vitamin K	Phytomenadione 10mg/1ml/amp(Katimin)	在安全的治療範圍內 可以使用

註:\*為高警訊藥品

更新日期：2021.11.10