

# 靜脈曲張治療評估重點

## 1. 是否為心血管外科醫師？

靜脈曲張常合併深部靜脈栓塞、周邊動脈疾病，且靜脈曲張本質即為血管病變退化，諮詢心血管外科醫師才有最專業的整體評估。

## 2. 是否有術前血管超音波檢查紀錄？

血管超音波檢查是治療規劃最重要的準則，目前健保均給付醫院多功能、高解析度超音波檢查。正式檢查報告會在健保雲端資料庫留存紀錄，以裨患者術前、術後追蹤；相較之下，診所血管超音波檢查並無健保給付，也無法上傳健保雲端資料庫留存，較無保障。

## 3. 是否採微創、局部麻醉方式進行治療？

目前靜脈曲張治療日新月異，以局部麻醉、門診手術方式即可進行不需手術刀口、不需縫合，術後可立即下床步行返家，無須住院。

## 4. 是否同時治療主軸隱靜脈與分支靜脈曲張血管？

同時進行主軸隱靜脈閉合與分支靜脈曲張血管治療，不僅風險低、術後患者也恢復最快最好；倘若僅施行主軸隱靜脈閉合術、不處置分支血管，術後恢復慢、復發率高，且有五成病人仍需再次治療！


# 靜脈曲張微創治療示意圖

大隱靜脈(主軸靜脈)

血管腔內雷射/射頻/靜脈膠治療  
(微創雷射/射頻/萬能膠手術)

分支靜脈曲張血管

微創靜脈曲張摘除術(健保)  
硬化劑注射治療(自費)  
若不同時治療，五成病人需再次手術



# 案例

80 歲男性，右腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前

手術治療後

術後四週

一次手術同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。



# 案例 76歲男性，雙腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前



手術治療後



術後一週

雙腿同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。

# 案例 75歲女性，雙腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前

手術治療後

術後三個月

雙腿同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。



**案例** 65歲男性，雙腿第三期靜脈曲張併發下肢腫脹。

右腿術前

術後二週

左腿術前

術後二週



雙腿在一次手術同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。

案例 70 歲女性，左腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前

術後六週

同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。



# 案例 60 歲女性，左腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前

手術治療後

術後六週

同時施行大隱靜脈（主軸靜脈）閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。



**案例** 50歲女性，左腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前

術後六週

手術後水腫明顯改善，下肢腫脹疼痛痠麻獲得徹底緩解！



# 案例

32 歲女性，右腿第三期靜脈曲張併發下肢水腫。

手術治療前

手術治療後

術後六週

同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。



**案例** 93歲男性，左腿第四期靜脈曲張併發下肢水腫、鬱血性皮膚炎色素沉著

手術治療前

術後六週

手術後水腫明顯改善，鬱血性皮膚炎引起的色素沉著逐漸消退；腫脹疼痛獲得完全緩解。



**案例** 82歲女性，右腿第四期靜脈曲張併發鬱血性皮膚炎、慢性蜂窩性組織炎

手術治療前



手術治療後



術後二個月

手術後蜂窩性組織炎完全緩解，鬱血性皮膚炎導致的色素沉著逐漸消退。

**案例** 75歲男性，雙腿第四期靜脈曲張併發鬱血性皮膚炎。

手術治療前



手術治療後



術後一週

雙腿同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。


案例 65歲男性，雙腿第四期靜脈曲張併發鬱血性皮膚炎。

右腿術前

術後四週

左腿術前

術後四週



雙腿在一次手術同時施行大隱靜脈(主軸靜脈)閉合術與微創分支靜脈曲張摘除術，鼓突分支靜脈曲張徹底廓清、恢復迅速、消除腫脹、不留疤痕。

# 案例 70歲男性，右腿第四期靜脈曲張併發血栓靜脈炎。

手術治療前

手術治療後

血栓靜脈炎

術後一個月

微創摘除術取出  
血栓 靜脈曲張血管



**案例** 70歲女性，左腿第四期靜脈曲張併發下肢水腫、鬱血性皮膚炎及色素沉著。

手術治療前

術後六個月

手術後水腫明顯改善，鬱血性皮膚炎引起的色素沉著逐漸消退；腫脹疼痛獲得完全緩解。



**案例** 65歲男性，右腿第四期靜脈曲張併發嚴重鬱血性皮膚炎、右腿腫脹、鬱血性濕疹導致搔癢難耐！

手術治療前

術後二個月

手術後鼓突靜脈曲張血管完全消失、水腫明顯改善，鬱血性皮膚炎引起的色素沉著逐漸消退；腫脹搔癢獲得完全緩解。



案例 63 歲男性，左腿第四期靜脈曲張併發下肢水腫及色素沉著。

手術治療前

術後六週

手術後水腫明顯改善，色素沉著逐漸消退；下肢腫脹疼痛症狀得到緩解！



**案例** 43歲女性，右腿第四期靜脈曲張併發嚴重鬱血性皮膚炎、右腿腫脹、鬱血性濕疹導致搔癢難耐！

手術治療前

手術治療後

術後二個月

手術後鼓突靜脈曲張血管完全消失、水腫明顯改善，鬱血性皮膚炎引起的色素沉著逐漸消退；腫脹搔癢獲得完全緩解。



**案例** 50歲女性，右腿第五期靜脈曲張併發鬱血性皮膚炎、慢性反覆癒合潰瘍傷口

手術治療前

手術治療後

術後一週

術後一週；靜脈曲張旋即廓清消除，潰瘍傷口完全癒合



案例 83 歲女性，右腿第六期靜脈曲張併發無法癒合慢性潰瘍。

手術治療前



手術治療後



術後二個月

潰瘍傷口完全癒合

案例 75 歲男性，左腿第六期靜脈曲張併發無法癒合慢性潰瘍。

手術治療前

術後三個月

潰瘍傷口完全癒合



案例 45 歲女性，雙腿第六期靜脈曲張併發無法癒合慢性潰瘍。

右腿  
外側



左腿

內側



外側



案例 45 歲女性，雙腿第六期靜脈曲張併發無法癒合潰瘍。

右腿外側



術後三個月

潰瘍傷口完全癒合



案例 45 歲女性，雙腿第六期靜脈曲張併發無法癒合潰瘍。

左腿內側



術後三個月



潰瘍傷口完全癒合

案例 45 歲女性，雙腿第六期靜脈曲張併發無法癒合潰瘍。

左腿外側



術後三個月

潰瘍傷口完全癒合



# 提醒您！

靜脈曲張是持續惡化之慢性疾病，手術為唯一治療方式。

靜脈曲張微創治療採局部麻醉、門診手術方式、術後立即下床步行返家、安全性高、恢復快且併發症少。

早期治療靜脈曲張（第三期之前）手術預後最佳。

中壢天晟靜脈曲張中心 林哲安醫師關心您！